

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
АНТИСТАКС®

Регистрационный номер: П№015635/01 от 23.03.2009

Торговое патентованное название: Антистакс®(Antistax®)

Лекарственная форма:

Капсулы

Состав

1 капсула содержит:

Винограда красных листьев экстракт сухой - 180,00 мг

Вспомогательные вещества:

Кремния диоксид коллоидный безводный - 9,35 мг

Декстроза (сироп глюкозы сухой) - 38,25 мг

Крахмал кукурузный - 8,40 мг

Магния стеарат - 2,60 мг

Тальк - 8,40 мг

Теоретическая масса содержимого капсулы - 247,00 мг

Оболочка капсулы:

Желатин - 63,004 мг

Натрия додецилсульфат - 0,152 мг

Вода очищенная - 11,020 мг

Титана диоксид - 0,760 мг

Железа оксида гидратат (Е 171) (железа оксид желтый) - 0,152 мг

Железа оксид (Е 172) (железа оксид красный) - 0,912 мг

Масса капсулы с содержимым - 323,00 мг

Описание:

Твердые желатиновые капсулы красно-коричневого цвета, размер 1.

Содержимое капсул – порошок коричневого или коричневого с красновато-фиолетовым оттенком цвета, с характерным, слегка ароматным запахом, допускается комкование и слипание порошка в виде столбика. Капсулы не должны быть липкими и не должны иметь трещин.

Фармакотерапевтическая группа:

Ангиопротекторное средство растительного происхождения.

Код АТХ: C05CA

Фармакологические свойства

Экстракт из красных листьев винограда содержит фармакологически активные флавоноиды, основными из которых являются кверцетин-глюкуронид и изокверцетин. Препарат оказывает защитное действие на эпителий сосудов (стабилизируя мембраны) и увеличивает эластичность сосудов (нормализуя сосудистую проницаемость). Снижение проницаемости сосудистой стенки для плазмы, белков или воды из сосудов в окружающую ткань замедляет образование отеков и уменьшает уже существующие отеки.

Показания

Профилактика и симптоматическое лечение хронической венозной недостаточности (в сочетании с варикозным расширением вен), включая отеки нижних конечностей, ощущения тяжести и усталости в нижних конечностях, чувство напряжения, парестезии (изменение чувствительности) и боль.

Противопоказания

Гиперчувствительность к компонентам данного препарата.

Беременность и лактация

АНТИСТАКС® не рекомендуется принимать во время беременности и в период лактации. Исследования по безопасности применения препарата у беременных и кормящих грудью не проводились.

Способ применения и дозы

Принимают внутрь. Рекомендуемая доза для взрослых составляет 2 капсулы день и должна приниматься утром до еды. Доза может быть увеличена до 4 капсул в день. Капсулы следует проглатывать целиком и запивать водой.

Побочные эффекты

Реакции гиперчувствительности, включая генерализованную зудящую сыпь, крапивницу. Нарушение со стороны ЖКТ, в т.ч. дискомфорт в желудке, тошнота.

Взаимодействия с другими лекарственными препаратами

Не известны.

Передозировка

О случаях передозировки или интоксикации не сообщалось.

Особые указания

В случае недостаточного или неудовлетворительного симптоматического эффекта в течение 6-ти недель лечения, следует рекомендовать пациенту проконсультироваться у врача в отношении других возможных причин отеков. Одна капсула содержит 7,5 мг глюкозы. В максимально рекомендованной суточной дозе (4 капсулы) содержится 30 мг глюкозы.

Форма выпуска

Капсулы 180 мг. По 10 или 20 капсул в блистерах из ПВХ/Al фольги. По 2, 5, 10 или 16 блистеров вместе с инструкцией по применению в картонную пачку.

Условия хранения

В сухом и недоступном для детей месте, при температуре 15-25°C.

Срок годности

36 месяцев.

Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Отпуск из аптек

Без рецепта.

Производитель

Фарматон СА, Швейцария
Швейцария, Лугано-Биоджио, Виа Мулини, СН-6934

Представительство в Москве:
119049, Москва, ул. Донская, 29/9, строение 1
Тел.: (495) 411-78-01, Факс: (495) 411-78-02