

**Инструкция**  
**по медицинскому применению препарата**  
**Дульколак®**

Регистрационный номер: П №014230/01 от 10.09.08

**Торговое название:** Дульколак

**Международное непатентованное название:** бисакодил

**Описание:**

Белые или слегка желтоватые торпедообразные суппозитории с гладкой или слегка маслянистой поверхностью с углублением в основании.

**Лекарственная форма:** суппозитории ректальные

**Состав**

1 суппозиторий содержит 10 мг бисакодила

Вспомогательное вещество: витепсол W45

**Фармакотерапевтическая группа:** слабительное средство

**Код АТХ:** А06АВ02

**Фармакологические свойства**

Бисакодил – местно действующее слабительное из группы производных дифенилметана. Как местное слабительное с антирезорбтивным эффектом Бисакодил после гидролиза в толстом кишечнике увеличивает секрецию воды и электролитов в толстом кишечнике, ускоряет и увеличивает его перистальтику. Это приводит к стимуляции дефекации, уменьшению времени эвакуации и размягчению стула.

Действие обусловлено прямой стимуляцией нервных окончаний в слизистой оболочке толстого кишечника.

**Показания к применению**

Запоры, обусловленные гипотонией толстой кишки.

Очищение кишечника в плане предоперационной подготовки.

Подготовка к инструментальным и рентгенологическим исследованиям.

**Противопоказания**

Кишечная непроходимость, обструктивные заболевания кишечника, острые заболевания органов брюшной полости, включая аппендицит, острые воспалительные заболевания кишечника, сильные боли в животе связанные с тошнотой и рвотой, что может быть признаком более тяжелого состояния.

Дульколак также противопоказан при тяжелой дегидратации, повышенной чувствительности к препарату или его компонентам.

Дети до 10 лет.

**Беременность и лактация**

Данные о достоверных и хорошо контролируемых исследованиях у беременных женщинах отсутствуют. Длительный опыт применения не выявил отрицательного влияния препарата на беременность. Бисакодил не проникает в грудное молоко. Однако, как и при использовании других лекарств, следует с

осторожностью назначать препарат во время беременности, особенно в первом триместре, и в период грудного вскармливания.

### **Способ применения и дозы**

#### При запорах

Если врач не назначил иначе, то следует использовать:  
взрослые и дети старше 10 лет – по 1 суппозиторию в сутки.

Суппозиторий вводится в прямую кишку заостренным концом вперед.  
Действие наступает примерно через 30 мин.

#### При подготовке к исследованиям и предоперационно.

При подготовке к исследованиям, пред- и послеоперационного лечения, медицинских состояниях, которые требуют облегчения дефекации Дульколак должен применяться под медицинским наблюдением.

Рекомендуется в комбинации с таблетками для достижения полного опорожнения. В дополнение к таблеткам, принятым накануне, рекомендуется один суппозиторий утром.

### **Побочное действие**

Со стороны желудочно-кишечного тракта возможны спастические боли в животе, диарея.

Очень редки реакции повышенной чувствительности с кожными проявлениями, крайне редко сообщалось о появлении анафилаксии.

Использование суппозитория может сопровождаться болью и местным раздражением, особенно при анальной трещине или язвенном проктите.

### **Передозировка**

При передозировке возможны: диарея, обезвоживание, спазмы в области живота, нарушение водно-электролитного баланса, гипокалиемия.

Дульколак как и другие слабительные, при хронической передозировке может привести к хронической диарее, болям в области живота, гипокалиемии, вторичному альдостеронизму, мочекаменной болезни. В связи с хроническим злоупотреблением слабительными может развиваться повреждение почечных канальцев, метаболический алкалоз и мышечная слабость, связанная с гипокалиемией.

Лечение: симптоматическое.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Диуретики или глюкокортикостероиды увеличивают риск нарушений электролитного баланса (гипокалиемия) при приеме высоких доз Дульколакс.

Нарушение электролитного баланса (гипокалиемия) усиливает действие сердечных гликозидов.

### **Особые указания**

Не следует применять препарат в течение длительного времени. Если существует необходимость ежедневного приема слабительных, следует обратиться к врачу для выявления таких причин. Длительный прием может привести к потере жидкости, нарушению баланса электролитов и гипокалиемии.

Головокружение и обмороки наблюдались у пациентов принимавших Дульколак. Анализ показал, что эти случаи связаны с обмороком при дефекации (или обмороком, вызванным напряжением при дефекации), или с вазовагальным ответом на боль в животе, которая может быть связана с

запором, что вынудило пациентов принимать слабительные, и не обязательно связаны с приемом препарата.

Дети не должны принимать бисакодил без рекомендации врача.

**Формы выпуска**

Суппозитории ректальные 10 мг. 6 суппозитория в стрип из алюминиевой фольги. Один стрип с инструкцией по применению в картонную пачку.

**Условия хранения**

Хранить в сухом месте, при температуре не выше +25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

**Срок хранения**

5 лет.

Не применять после истечения срока годности.

**Условия отпуска**

Отпускается без рецепта.

**Производитель:**

Берингер Ингельхайм Интернешнл ГмбХ, Германия,  
произведено Институт де Ангели С.Р.Л., Италия  
50066 Реггелло, Лок. Прулли, 103/С, Флоренция, Италия

Представительство в Москве:

119049 Москва, ул. Донская 29/9, стр.1,  
тел. (495) 411 78 01; факс: (495) 411 78 02