

**Инструкция  
по медицинскому применению препарата  
ФИНАЛГЕЛЬ®**

**Регистрационный номер:** П N 016210/01 от 15.02.2010

**Торговое (патентованное) название:** Финалгель®

**Международное непатентованное название:** пироксикам

**Лекарственная форма**

гель для наружного применения

**Состав:**

В 1 г геля содержится: активного вещества пироксикама - 5 мг

Вспомогательные вещества: пропиленгликоль, изопропанол, макрогола глицерилкокоат (цетиол HE), гипромеллоза (гидроксипропилметилцеллюлоза), натрия гидроксид, натрия дисульфит (натрия метабисульфит), калия дигидрофосфат, вода очищенная

**Описание:**

Прозрачный или слегка опалесцирующий светло-желтого цвета гель со слабым запахом изопропилового спирта

**Фармакотерапевтическая группа:** нестероидный противовоспалительный препарат (НПВП)

Код АТХ: M02AA07

**Фармакологические свойства**

Обладает противовоспалительным, обезболивающим, местным охлаждающим действием. Неселективно подавляет циклооксигеназу 1 и 2.

**Фармакокинетика**

После нанесения 4 г препарата на кожу максимальная концентрация пироксикама в системном кровотоке составляет  $149,2 \pm 30,3$  нг / мл.

**Показания**

Болевой синдром: анкилозирующий спондилоартрит, остеоартроз, ревматоидный артрит, ювенильный хронический артрит, тендинит, тендовагинит, плече-лопаточный синдром; спортивные травмы (ушибы, вывихи, повреждение связок).

**Противопоказания**

- гиперчувствительность к пироксикаму или другим компонентам препарата;
- гиперчувствительность к ацетилсалициловой кислоте или к другим НПВП;
- беременность (III триместр);
- почечная недостаточность;
- возраст до 14 лет.

### ***С осторожностью***

бронхиальная астма, аллергический ринит, рецидивирующий полипоз носа и околоносовых пазух, хронические обструктивные заболевания легких или хронические легочные инфекции.

### ***Беременность и период лактации***

Финалгель® следует с осторожностью применять во время I и II триместра беременности.

Пироксикам в незначительных количествах может проникать в грудное молоко, поэтому не рекомендуется применять препарат в период кормления грудью.

### **Способ применения и дозы**

Наружно. Взрослым и детям старше 14 лет по 1 г геля (примерно соответствует размеру лесного ореха) 3-4 раза в день. Гель следует нанести на кожу над пораженной областью и слегка втереть.

Продолжительность лечения зависит от выраженности симптомов и в среднем составляет 2-3 недели при тендинитах, тендовагинитах и плече-лопаточном синдроме; 1-2 недели при спортивных травмах.

### **Побочное действие**

- местное раздражение кожи (воспаление, покраснение, крапивница, зуд, шелушение);
- местные аллергические реакции.

### **Передозировка**

При применении препарата в дозах, превышающих рекомендуемые, в единичных случаях не исключается возникновение системных побочных эффектов: головной боли; нарушений со стороны желудочно-кишечного тракта (тошнота, боль в эпигастриальной области); одышки.

Описан единичный случай развития интерстициального нефрита с функциональной почечной недостаточностью и нефротическим синдромом.

В случае появления симптомов передозировки препарат следует отменить и обратиться к врачу.

Лечение: симптоматическое.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Не известно.

### **Особые указания**

Пациенты, страдающие бронхиальной астмой, аллергическим ринитом, рецидивирующим полипозом носа и околоносовых пазух, хроническими обструктивными заболеваниями легких или хроническими легочными инфекциями, как правило, более чувствительны к применению НПВП. У этих пациентов могут участиться приступы астмы, появиться отек Квинке и крапивница.

Не следует наносить гель на поврежденные кожные покровы, в том числе открытые раны. Избегать попадания в глаза.

### ***Влияние на способность водить машину или работать с механизмами***

Не известно.

### **Форма выпуска**

Гель для наружного применения 0,5%. По 35 г или 50 г в тубу алюминиевую, закрытую колпачком из пластмассы с пробойником для мембраны. Тубу с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.

**Условия хранения**

При температуре не выше 25°C, в недоступном для детей месте.

**Срок годности**

5 лет. 6 месяцев с момента вскрытия тубы.

Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

**Условия отпуска из аптек**

Без рецепта.

**Производитель**

Берингер Ингельхайм Интернешнл ГмбХ,

Бингерштрассе, 173, 55216 Ингельхайм-на-Рейне, Германия,

произведено С.П.М. КонтрактФарма ГмбХ и Ко. КГ, Фрюлингштрассе, 7, 83620

Фельдкирхен-Вестерхам, Германия.

**Претензии потребителей направлять по адресу Представительства в Москве:**

119049, Москва, ул. Донская, 29/9, строение 1

тел: (495) 411-78-01; факс: (495) 411-78-02