

**Инструкция
по медицинскому применению
препарата Финалгон®**

Регистрационный номер: П N 015513/01 от 05.02.2010

Торговое (непатентованное) название: Финалгон ®

Международное непатентованное название или группировочное название:
Никобоксил + Нонивамид

Лекарственная форма: мазь для наружного применения

Состав

В 1 г мази содержится:

нонивамид (ваниллиламид нониловой кислоты) (PSVA)	4	мг
никобоксил (бутоксипропиловый эфир никотиновой кислоты) (NSBE)	25	мг

Вспомогательные вещества:

Диизопропиладипинат (Кродамол), кремния диоксид коллоидный, вазелин (парафин, мягкий белый), сорбиновая кислота, масло цитронеллы, вода очищенная.

Описание

Почти бесцветная или слегка коричневатая, прозрачная или полупрозрачная, однородная гомогенная мазь.

Фармакологическая группа: местнораздражающее средство

Код АТХ: M02AX10

Фармакологические свойства

Нонивамид

Является синтетическим аналогом капсаицина и обладает обезболивающими свойствами, которые проявляются в результате постепенного проникновения вещества в периферические ноцицептивные С-волокна и А-дельта нервные волокна при повторном нанесении препарата на кожу.

Никобоксил

Оказывает прямое сосудорасширяющее действие.

Комбинированное действие

Нонивамид и никобоксил обладают дополняющими друг друга сосудорасширяющими свойствами, вызывают гиперемиию кожи, увеличивают скорость ферментативных реакций, активизируют обмен веществ.

Появление покраснения и повышение температуры кожи в течение нескольких минут после нанесения свидетельствуют о быстром проникновении активных компонентов препарата в кожу. Действие Финалгона® проявляется локально.

Действие препарата развивается в течение нескольких мин., максимальный эффект наступает через 20-30 мин.

Показания

Артрит, ревматическая боль в суставах и мышцах, спортивные травмы, ушибы и повреждения связочного аппарата, мышечная боль, вызванная чрезмерной физической нагрузкой, люмбаго, неврит, ишиалгия, бурсит и тендовагинит.

Для предварительного «разогрева» мышц перед физическими упражнениями, спортивными соревнованиями. В составе комплексной сосудорасширяющей терапии при нарушениях периферического кровообращения.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к препарату, дерматоз. Не наносить на открытые кожные раны и участки кожи с повышенной проницаемостью, на шею, низ живота и внутреннюю сторону бедер.

Детский возраст до 12 лет.

Беременность и период лактации

Нет данных о том, проникает ли препарат в грудное молоко. Не использовать препарат в период беременности и грудного вскармливания.

Способ применения и дозы

Столбик препарата размером не более 0,5 см, при помощи прилагаемого аппликатора, наносится на соответствующий участок кожи размером с ладонь лёгкими втирающими движениями. Для усиления лечебного действия участок кожи, на который нанесен препарат, можно накрыть шерстяной тканью.

Для предварительного разогревания мышц перед физическими упражнениями, спортивными соревнованиями рекомендуется втирать примерно за 30 минут до их начала.

При многократном применении реакция на мазь может уменьшаться, что требует увеличения дозы, которая подбирается индивидуально. Мазь используют 2-3 раза в день.

При отсутствии желаемого эффекта в течение 10 дней следует обратиться к специалисту.

После нанесения препарата на кожу следует тщательно вымыть руки с мылом.

Побочное действие

Аллергические реакции (например, кожная сыпь и отек лица); лёгкое кратковременное раздражение кожи и чувство жжения могут быть более выражены при использовании избыточного количества препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Взаимодействия с другими препаратами, применяемыми местно или системно, не выявлены.

Особые указания

После использования препарата Финалгон® следует немедленно вымыть руки с мылом. Необходимо соблюдать осторожность и избегать случайного попадания препарата на другие участки кожи, а также в глаза, нос или рот, так как это вызовет безвредное, но неприятное чувство жжения.

Пациентам с чувствительной кожей не следует принимать горячую ванну или душ до или после нанесения препарата на кожу.

При использовании избыточного количества Финалгона® эффект может быть уменьшен, если удалить мазь с поверхности кожи при помощи растительного масла или питательного крема, со слизистой оболочки глаза – с помощью медицинского вазелина.

Форма выпуска

Мазь для наружного применения. По 20 г или 50 г в тубу алюминиевую, закрытую колпачком из пластмассы с пробойником для мембраны. Каждую тубу с аппликатором и инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Срок годности

4 года.

Не использовать после истечения срока годности.

Условия хранения

При температуре не выше 25°C, в недоступном для детей месте.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Фирма-производитель:

Берингер Ингельхайм Интернешнл ГмбХ,
Бингерштрассе 173, 55216 Ингельхайм-на-Рейне, Германия,
произведено Хаупт Фарма Вольфратсхаузен ГмбХ,
Пфаффенридер штрассе 5, D-82515 Вольфратсхаузен, Германия,
или Берингер Ингельхайм Интернешнл ГмбХ,
Бингерштрассе 173, 55216 Ингельхайм-на-Рейне, Германия,
произведено Глобофарм фармацойтише Продуктьонс унд Хандельсгезелльшафт мбХ,
Брайтенфуртерштрассе 251, А-1230 Вена, Австрия

Представительство в Москве.

119049, Москва, ул. Донская, 29/9, строение 1

тел: (495) 411-78-01; факс: (495) 411-78-02