

Основные цели терапии ИЛФ

ИЛФ (ИДИОПАТИЧЕСКИЙ ЛЕГОЧНЫЙ ФИБРОЗ)

Какой аспект жизни с ИЛФ считается самым важным?

Степень информированности о доступных вариантах лечения



Вопрос первоочередной важности для **74% пациентов*** и **77% врачей**** полагают, что данному вопросу имеет первоочередную важность для пациентов

Какие три основных приоритета процесса лечения?

ПО МНЕНИЮ ПАЦИЕНТОВ*



58%

Поддержание функции легких в течение максимально долгого времени



14%

Снижение риска внезапного ухудшения состояния



12%

Прием лекарств с поддающимися контролю побочными эффектами



МНЕНИЯ ВРАЧЕЙ О ПРИОРИТЕТАХ ПАЦИЕНТОВ**

83%

Терапия, которая позволяет пациенту продолжать вести привычный образ жизни



69%

Эффективная терапия вне зависимости от стадии заболевания

67%

Поддержание функции легких в течение максимально долгого времени



Для получения более подробной информации об ИЛФ и результатах социопроса посетите наш веб-сайт по адресу www.lifewithipf.com

*Неопубликованные данные. Компания Boehringer Ingelheim. Глобальный социопрос среди пациентов «Подумай обо всем». 2016 г. Глобальный социопрос среди 152 пациентов из 9 стран для сбора их мнений в отношении идиопатического легочного фиброза (ИЛФ)
**Неопубликованные данные. Компания Boehringer Ingelheim. Глобальный социопрос среди пульмонологов «Подумай обо всем». 2015 г. Мнения, полученные у пациентов в ходе этого социопроса, были сопоставлены с результатами аналогичного глобального социопроса, который был проведен в 2015 году и в котором приняли участие более 400 пульмонологов; на вопрос о том, что, по их мнению, является приоритетным для их пациентов, пульмонологи дали следующие ответы